



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apeilor



PROGNOZA PENTRU LUNA MARTIE

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

Pentru luna martie, nivelurile piezometrice vor avea un regim staționar în aproape 78% dintre forajele monitorizate și creșteri doar în 8% dintre acestea, respectiv, în câmpiile Băilești, Pitești, Ilfov, Gherghița, în Lunca Buzăului și în Balta Brăilei. Scăderi între 10 și 40 de cm se pot produce în Podișul Teslui, în câmpiile Punghina, Leu-Rotunda, Titu, Ilfov, Otopeni, Roșiori.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna martie vor avea o tendință de staționaritate în aproape 65% dintre forajele de observație. Tendința de creștere se poate manifesta, pe alocuri, în câmpiile Banloc, Timișoara și în Depresiunea Făget.

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna martie vor avea tendință staționară în aproape 80% din numărul forajelor de observație. În aproape 17% dintre acestea, regimul va fi descrescător în culoarele râurilor Iza, Someșul Mare și Someșul Mic, Târnava Mică și în depresiunile Ciceu și Făgăraș.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna martie, nivelurile piezometrice freatice vor avea o tendință generală de staționaritate în aproape 82% dintre foraje, iar în 15%, regimul va fi descrescător. Scăderi între 10 și 20 cm ale nivelurilor sunt posibile în forajele situate în culoarele râurilor Moldova și Roman-Adjud, în Colinele Bălăbănești și în Podișul Vulturești, precum și în Depresiunea Huși.

Podișul Dobrogei

În luna martie, apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea un regim în ușoară creștere în podișurile Casimcea și Mangalia, descrescător în Dobrogea de Nord.

DIRECTOR,

Ing. Nicolae BĂRBĂLESCU

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. Constantin Cristian STOIAN

ȘEF SECȚIE CERCETĂRI APE SUBTERANE,
Ing. Cătălina RADU

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,

Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN
(dragusin@hidro.ro)

Dr. ing. Aurel ROTARU
(aurel.rotaru@hidro.ro)

BULETIN HIDROGEOLOGIC REGISTRATURA

- pentru apele subterane freatice

Martie 2025

Nr. 634

CARACTERIZAREA LUNII FEBRUARIE

Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

În luna februarie, prin comparație cu luna ianuarie, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 31% din totalul forajelor aflate în observație, au scăzut în 35%, iar în 34% dintre acestea regimul a fost staționar. Creșteri de nivel de până la 40 cm s-au înregistrat în Dealurile Cernei, în Depresiunea Cislău, în luncile râurilor Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Călmățui, precum și în câmpiile Punghina, Băilești, Caracal, Titu, Ilfov, Roșiori, Viziru. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 89% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 450 cm (Brastavățu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna februarie au înregistrat scăderi cu până la 30 cm față de luna anterioară în aproape 44% din numărul punctelor de observație. Nivelurile au înregistrat creșteri de până la 20 cm în aproximativ 24% din numărul punctelor monitorizate, în depresiunile Baia Mare și Făget, în câmpiile joase ale Someșului și Crișurilor, în câmpiile Arad, Nădlac, Banloc și Moravița. În aproape 32% dintre foraje nivelul a fost aproape staționar. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 98% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 410 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna februarie cu până la 50 cm în 34% din totalul forajelor de monitorizare, au crescut în aproape 7% dintre acestea, iar în 59%, acviferele au avut un regim staționar. Scăderile au fost înregistrate în culoarele râurilor Someș, Târnava Mică și Aiud și în depresiunile Câmpia Turzii, Gheorgheni, Ciceu, Prejmer, Bârsa, Făgăraș și Sibiu. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 90% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 170 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna februarie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au înregistrat creșteri de până la 70 cm în aproape 36% din forajele situate în colinele Gloduri, Chiejei și Ibăneși în dealurile Chicerii și Pleșu, în Glacisul Orbeni și Podișul Vulturești, în depresiunile Huși și Hârlău, precum și în culoarele râurilor Bistrița, Moldova, Siret și Prut. Scăderi de până la 40 cm au fost înregistrate în 38% dintre forajele situate în Podișul Sacovăț, în colinele Bălăbănești și Miletin, și în culoarele râurilor Roman-Adjud și Prut. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 79% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 430 cm (Berchișești, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna februarie, nivelurile piezometrice înregistrate evidențiază creșteri în Colinele Murighiol și în podișurile Casimcea și Mangalia și un regim staționar în Dobrogea de Sud. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 450 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15

Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488

Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA MARTIE IN RAPORT CU MEDIA LUNII FEBRUARIE SI CU MINIMELE ISTORICE



Legenda

Nivelul piezometric al lunii februarie
si tendinta de evolutie pentru luna martie (cm)

- 265 (-20) ▲ Niveluri în crestere (<-5)
95 (4) ● Niveluri stationare (-5÷5)
108 (30) ▼ Niveluri în scadere (>5)

Corpuri de ape subterane freatice a caror
suprafata piezometrica se situeaza
fata de minima istorica astfel:

- mai mult de 100 cm deasupra
■ între 99 – 50 cm deasupra
■ între 51 – 0 cm deasupra
■ sub minima istorica

