



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor



PROGNOZA PENTRU LUNA OCTOMBRIE

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

În luna octombrie, nivelurile piezometrice vor avea un regim staționar în aproape 68% dintre forajele de monitorizare și descrescător în aproape 27% dintre punctele de monitorizare.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna octombrie vor avea o tendință de scădere în aproape 30% dintre forajele de observație, iar în 62% dintre acestea, regimul va fi cvasistaționar. Pe alocuri, în câmpiile joase ale Someșului și Crișurilor, Timișoara și Banloc, tendința este ușor crescătoare.

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna octombrie vor avea tendință descrescătoare în aproape 20% din numărul forajelor de observație amplasate în Dealurile Nirajului, Culmea Făget, Podișul Rotbav, depresiunile Sibiu, Bârsa și Făgăraș și staționară în 75% dintre acestea.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna octombrie, nivelurile piezometrice vor avea o tendință generală de staționaritate în aproape 66% dintre foraje, iar în 32%, respectiv în forajele situate în colinele Gloduri, în depresiunile Rădăuți, Bistrița-Cracău și Huși, pe alocuri în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman - Adjud, Prut și Siret, regimul va fi descrescător.

Podișul Dobrogei

În luna octombrie, apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea un regim descrescător.

DIRECTOR,

Ing. Nicolae BĂRBIERU

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. Constantin Cristian STOIAN

ȘEF SECȚIE CERCETĂRI APE SUBTERANE,

Dr. ing. Teodora VASILE

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,

Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN
(dragusin@hidro.ro)

Dr. ing. Aurel ROTARU
(aurel.rotaru@hidro.ro)

BULETIN HIDROGEOLOGIC

- pentru apele subterane freatice -

Octombrie 2025

Nr. 641

CARACTERIZAREA LUNII SEPTEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

În luna septembrie, prin comparație cu luna august, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 69% din numărul forajelor aflate în observație, au crescut în 10%, iar în 21% dintre acestea regimul a fost staționar. Creșteri de nivel de până la 20 cm s-au înregistrat pe alocuri în lunca Bistrețului, în Dealurile Cernei și în câmpiile Băilești, Caracal, Otopeni, Sărata și Siret. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 86% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 420 cm (Brastavățu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna septembrie au înregistrat scăderi de până la 40 cm față de luna anterioară în aproape 84% din numărul punctelor de observație, au crescut în 5% dintre acestea, iar în restul nu au avut variații. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 98% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 380 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna septembrie cu până la 60 cm în 80% din totalul forajelor de monitorizare. Creșteri de până la 20 cm au fost înregistrate în depresiunile din Carpații Orientali. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 83% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 170 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna septembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au înregistrat creșteri de până la 30 cm în aproape 18% din forajele de monitorizare și au scăzut în 68% dintre acestea. Creșterile s-au produs, pe alocuri, în zona colinelor Gloduri și Miletin, în culoarele râurilor Bistrița, Siret și Prut și în depresiunile Bistrița și Tazlău. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 76% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 160 cm (Tupilați, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna septembrie, nivelurile piezometrice înregistrate evidențiază creșteri în zona Dunavăț și în Podișul Gârliciu, în restul punctelor monitorizate scăderile măsurând între 4 și la 30 cm. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 89% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 515 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15

Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488

Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA OCTOMBRIE IN RAPORT CU MEDIA LUNII SEPTEMBRIE SI CU MINIMELE ISTORICE



Legenda

Nivelul piezometric al lunii septembrie
si tendinta de evolutie pentru luna octombrie (cm)

- 265 (-20) ▲ Niveluri in crestere (<-5)
95 (4) ● Niveluri stationare (-5÷5)
108 (30) ▼ Niveluri in scadere (>5)

Corpuri de ape subterane freatice a caror
suprafata piezometrica se situeaza
fata de minima istorica astfel:

- mai mult de 100 cm deasupra
■ intre 99 – 50 cm deasupra
■ intre 51 – 0 cm deasupra
■ sub minima istorica

