



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor



PROGNOZA PENTRU LUNA DECEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

În luna decembrie, în 27% dintre forajele de monitorizare, nivelurile piezometrice vor avea un regim crescător în aceleași zone, și staționar în aproape 68% dintre acestea.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie vor avea o tendință de creștere în aproape 28% dintre forajele de observație situate în câmpiile joase ale Someșului și Crișurilor, în câmpiile Valea lui Mihai, Miersig, Aranca, Banloc, Moravița, Timișoara, în Dealurile Nerei și în depresiunile Copalnic, Zalău, Făget și Vărădia. În aproape 68% dintre forajele de monitorizare, nivelurile vor avea un regim al cvasistaționar, iar în restul forajelor, scăderile vor fi de până la 10 cm.

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna decembrie vor avea tendință predominant staționară, creșteri fiind posibile în aproape 27% din numărul forajelor de observație amplasate în culoarele râurilor Iza, Someș, Someșul Mare, Someșul Mic, Târnava Mică și în depresiunile Prejmer, Ciceu și Făgăraș și staționară în 68% dintre acestea.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna decembrie, nivelurile piezometrice vor avea o tendință generală de staționaritate în aproape 72% dintre foraje, iar în 15%, respectiv în forajele situate în depresiunile Rădăuți, Neamț și Bistrița-Cracău, regimul va fi ușor crescător.

Podișul Dobrogei

În luna decembrie, apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea un regim cvasistaționar, cu posibile creșteri în Podișul Casimcea și în zona Murighiol.

DIRECTOR,

Ing. Nicolae BĂRBIERU

DIRECTOR ADJUNCT,
Ing. Constantin Cristian STOIAN

ȘEF SERVICIU CERCETĂRI APE SUBTERANE,
Dr. ing. Teodora VASILE

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,
Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN
(dragusin@hidro.ro)

Dr. ing. Gabriela STĂNESCU
(gabriela.stanescu@hidro.ro)

BULETIN HIDROGEOLOGIC

- pentru apele subterane freatice -

Decembrie 2025

Nr. 643

CARACTERIZAREA LUNII NOIEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

În luna noiembrie, prin comparație cu luna octombrie, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 51% din numărul forajelor aflate în observație, au scăzut în 23%, iar în 26% dintre acestea regimul a fost staționar. Creșteri de nivel de până la 50 cm s-au înregistrat mai ales în Câmpia Română Centrală și de Est, pe alocuri în Piemontul Getic și în Câmpia Olteniei. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 85% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 420 cm (Brastavățu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna noiembrie au înregistrat creșteri de până la 25 cm față de luna anterioară în aproape 30% din numărul punctelor de observație, au scăzut în 25% dintre acestea (mai ales în Câmpia Banatului), iar în 45% nu au avut variații. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 98% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 370 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali


Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna noiembrie cu până la 30 cm în 29% din totalul forajelor de monitorizare. Scăderi de până la 10 cm au fost înregistrate în depresiunile Jibou, Gheorgheni, Făgăraș și Sibiu, în Podișul Rotbav și în culoarele râurilor Iza, Someșul Mare și Someșul Mic. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 80% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 165 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna noiembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au înregistrat creșteri de până la 30 cm în 36% din forajele de monitorizare și au scăzut în 31% dintre acestea. Creșterile s-au produs în zona colinelor Gloduri și Chinejei, în culoarele râurilor Moldova, Roman - Adjud, Siret și Prut și în depresiunile Dorohoi, Hârlău, Bistrița, Huși și Tazlău. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 79% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 150 cm (Tupilați, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna noiembrie, nivelurile piezometrice înregistrate evidențiază creșteri în Dobrogea de Nord și în podișurile Casimcea și Gârliciu, iar în podișurile Cobadin și Mangalia scăderile măsurând între 2 și la 20 cm. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 455 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).



INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15

Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488

Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA DECEMBRIE IN RAPORT CU MEDIA LUNII NOIEMBRIE SI CU MINIMELE ISTORICE



Legenda

Nivelul piezometric al lunii noiembrie
si tendinta de evolutie pentru luna decembrie (cm)

- 265 (-20) ▲ Niveluri in crestere (<-5)
95 (4) ● Niveluri stationare (-5÷5)
108 (30) ▼ Niveluri in scadere (>5)

Corpuri de ape subterane freatice a caror
suprafata piezometrica se situeaza
fata de minima istorica astfel:

- mai mult de 100 cm deasupra
■ intre 99 – 50 cm deasupra
■ intre 51 – 0 cm deasupra
■ sub minima istorica

