



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apeilor



PROGNOZA PENTRU LUNA FEBRUARIE

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

În luna februarie, nivelurile piezometrice în forajele de monitorizare vor avea un regim staționar în 92 % în dintre acestea. Posibile scăderi ale nivelului freatic sunt estimate în Câmpia Băilești, Podișul Teslui și Câmpul Nedeii și creșteri în foraje din Câmpia Jianeii, luncile Bistrețului și Jiu - Jieț.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile apelor subterane freatice în luna februarie vor avea o tendință generală de staționaritate în 86% dintre foraje. În 10% dintre forajele monitorizate sunt posibile creșteri ale nivelului (Câmpia Joasă a Crișurilor, depresiunile Caraș, Vărădia și Baia Mare, câmpiile Miersig și Timișoara).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile apelor freatice în luna februarie vor avea tendință predominant staționară, în aproximativ 94% dintre foraje, creșteri fiind posibile în aproximativ 6% din numărul forajelor monitorizate, amplasate în Culoarul Aiud și Depresiunea Făgăraș.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna februarie, nivelurile piezometrice vor avea o tendință generală de staționaritate în aproape 95% dintre foraje, iar în restul, regimul va fi descrescător (foraje din culoarele râurilor Moldova și Prut)

Podișul Dobrogei

În luna februarie, apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea un regim cvasistaționar în toate forajele de monitorizare.

DIRECTOR,

Ing. Nicolae BĂRBIERU

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. Constantin Cristian STOIAN

ȘEF SERVICIU CERCETĂRI APE SUBTERANE,
Dr. ing. Teodora VASILE

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,

Dr. ing. Gabriela STĂNESCU
(gabriela.stanescu@hidro.ro)

Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN
(dragusin@hidro.ro)

BULETIN HIDROGEOLOGIC

Februarie 2026

Nr. 645

CARACTERIZAREA LUNII IANUARIE



Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

În luna ianuarie, prin comparație cu luna decembrie, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 56% din numărul forajelor aflate în observație, au scăzut în 13%, iar în 31% dintre acestea regimul a fost staționar. Creșteri de nivel de peste 100 cm, datorate precipitațiilor, s-au înregistrat în Depresiunea Cislău, Culoarul Jiului și Dealurile Cernei, iar în Câmpia Snagovului, Câmpia Jianeii, Depresiunea Târgu Jiu și Podișul Teslui, creșterile de nivel s-au situat în intervalul 50 - 100 cm. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 78% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 435 cm (Brastavățu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile apelor subterane freatice în luna ianuarie au înregistrat creșteri față de luna anterioară în aproape 42% din numărul punctelor de observație, au scăzut în 29% dintre acestea, iar în 29% nu au avut variații. Creșteri cu până la 100 cm s-au înregistrat în Câmpia Timișoarei (Remetea Mare). Scăderi cuprinse între 10 - 27 cm s-au înregistrat în special în Câmpia Joasă a Crișurilor, câmpiile Miersig și Banloc și Câmpia Joasă a Someșului. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 97% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 370 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile apelor subterane freatice au crescut în luna ianuarie cu până la 60 cm în 31% din totalul forajelor de monitorizare. Scăderi de până la 80 cm au fost înregistrate în depresiunile Făgăraș, Prejmer, Săliște, Sibiu, Ciceu, Gheorgheni, Dărmănești, Bârsei și Câmpia Turzii, Culmea Făgetului și în culoarele râurilor Someș, Târnava Mică și Aiud, în 25% dintre punctele de monitorizare. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în 72% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 150 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna ianuarie, nivelurile apelor subterane freatice au înregistrat creșteri de până la 15 cm în 15% din forajele de monitorizare și au scăzut în 49% dintre acestea. Scăderile s-au produs în zona colinelor Miletin, Ibăneși și Chinejei, în culoarele râurilor Moldova, Suceava, Roman - Adjud, Siret și Prut, în depresiunile Rădăuți, Dorohoi, Cașin, Tazlău, Hârlău, Bistrița - Cracău și Huși, în Dealul Pleșu, Glacisul Orbeni și podișurile Sacovăț și Vulturești. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 76% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 150 cm (Tupilați, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna ianuarie, nivelurile piezometrice înregistrate evidențiază scăderi în 67% din forajele de monitorizare situate în podișurile Mangaliei, Cobadin și Gârliciu și Colinele Murighiol și creșteri în 22% dintre forajele aflate în podișurile Casimcea și Cernavodă și Glacisul Măcinului. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 451 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15

Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488

Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA FEBRUARIE IN RAPORT CU MEDIA LUNII IANUARIE SI CU MINIMELE ISTORICE

Legenda

Nivelul piezometric al lunii ianuarie
si tendinta de evolutie pentru luna februarie (cm)

- 265 (-20) ▲ Niveluri in crestere (<-5)
- 95 (4) ● Niveluri stationare (-5÷5)
- 108 (30) ▼ Niveluri in scadere (>5)

Corpuri de ape subterane freatice a caror
suprafata piezometrica se situeaza
fata de minima istorica astfel:

- mai mult de 100 cm deasupra
- intre 99 – 50 cm deasupra
- intre 51 – 0 cm deasupra
- sub minima istorica

