



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apeilor



PROGNOZA PENTRU LUNA IULIE

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

În luna iulie, se estimează că nivelurile apelor subterane freatice în forajele de monitorizare vor avea un regim staționar în 45% dintre acestea și vor scădea aproximativ 48% dintre forajele aflate în câmpiile Băilești, Caracal, Călniștea, Cotroceni, Gherghiței, Ilfov, Jiana, Ploiești, Pungina, Siret, Snagov și Titu, culoarele râurilor Jiu și Olt, luncile Argeș - Sabar, Bârlad, Călmățui, Jiu - Jieț și Ialomița, depresiunile Cislău și Târgu Jiu, Dealurile Cernei, bălțile Brăilei și Borcei, câmpurile Amara, Ianca, Leu - Rotunda, Otopeni, Ștefan - Vodă, Urziceni și Viziru.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile apelor subterane freatice în luna iulie vor avea o tendință generală de scădere în 67% dintre forajele monitorizate și de staționaritate în 32% dintre acestea. Scăderi ale nivelului pot avea loc în foraje din Câmpia Joasă a Crișurilor, Câmpia Joasă a Someșului, Dealurile Nerei, depresiunile Baia Mare, Caransebeș, Copalnic, Făget, Zalău, Vărădia și Vad - Oradea, câmpiile Aranca, Banloc, Barcău, Bega, Cermei, Ier, Miersig, Moravița, Nădlac, Sinersig, Timișoara și Valea lui Mihai.

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

În 51% dintre foraje, în luna iulie, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendință predominant staționară. Sunt posibile scăderi de nivel în aproximativ 44% din numărul forajelor monitorizate amplasate în Culmea Făgetului, culoarele Aiudului, Devei, Mureșului, Someșelor Mic și Mare, Târnavei Mici, Dealurile Nirajului și depresiunile Bârsei, Ciceu și Făgăraș.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna iulie, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendință generală de staționaritate în aproximativ 50% dintre foraje. În 45% dintre forajele amplasate în podișurile Sacovăț și Vulturești, Glacisul Orbeni, depresiunile Huși și Rădăuți, în culoarele râurilor Bârlad, Moldova, Prut, Siret și Suceava, în Dealul Pleșu și colinele Gloduri- Coadă Stâncii, Ibăneșei și Miletinului pot exista scăderi.

Podișul Dobrogei

Apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea în luna iulie un regim staționar în 43% din forajele de monitorizare. În restul de 57% dintre foraje regimul va fi unul în scădere (foraje din Colinele Murighiol și podișurile Casimcea, Cobadin și Gârliciu).

DIRECTOR,

Ing. Cristian Constantin STOIAN

ȘEF SERVICIU CERCETĂRI APE SUBTERANE,
Dr. ing. Teodora VASILE



DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,
Dr. ing. Gabriela STĂNESCU
(gabriela.stanescu@hidro.ro)

Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN
(dragusin@hidro.ro)

BULETIN HIDROGEOLOGIC

- pentru apele subterane freatice -

IULIE 2026

Nr. 650

CARACTERIZAREA LUNII IUNIE



Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

Comparativ cu luna mai, în luna iunie, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 50% din numărul forajelor aflate în observație, au avut un regim staționar în 16% și au scăzut în 34% dintre acestea. Scăderi de nivel situate în intervalul 50 - 100 cm s-au înregistrat în câmpiile Caracal, Gherghiței și Balta Borcei, iar în Balta Brăilei, câmpiile Băilești, Burdea, Călniștea, Ilfov, Jianei, Pungina, Siret, câmpurile Nana, Otopeni și Viziru, Culoarul Jiului, luncile Jiu - Jieț și Călmățui, Dealurile Cernei și Depresiunea Târgu - Jiu scăderile au fost situate în intervalul 20 - 50 cm. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 71% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 370 cm (Brastavățu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

În luna iunie, nivelurile apelor subterane freatice au înregistrat scăderi față de luna anterioară în 76% din numărul punctelor de observație, nu au avut variații în 21% și au crescut în 3% dintre acestea. Scăderi de până la 60 cm s-au înregistrat în câmpiile Arad, Aranca, Banloc, Bega, Cermei, Gătaia, Ier, Miersig, Moravița, Nădlac, Sinersig, Timișana, Timișoara, Valea lui Mihai și Vinga, Câmpia Joasă a Crișurilor, Câmpia Joasă a Someșului, Dealurile Nerei și depresiunile Baia Mare, Caraș, Copalnic, Făget, Vad - Oradea, Vărădia și Zalău. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 98% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 390 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în luna iunie comparativ cu luna mai în 44% din totalul forajelor de monitorizare, în 18% dintre acestea regimul a fost staționar, iar în 38% au fost înregistrate creșteri. Scăderi de nivel până la 50 cm au fost înregistrate în depresiunile Ciceu, Dărmănești, Făgăraș, Gheorghieni și Sibiu și în culoarele râurilor Aiud, Deva, Mureș, Someșul Mic și Mare, Târnavă Mică și Târnavă Mare și Culmea Făgetului. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile s-au situat, în 74% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 160 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna iunie, în comparație cu luna anterioară, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în 50% din forajele de monitorizare și au crescut în 30% dintre acestea. Scăderi de până la 30 cm s-au produs în dealurile Chicerii și Pleșu, în zona colinelor Chinei și Gloduri- Coadă Stâncii, în culoarele râurilor Bârlad, Moldova, Roman - Adjud, Prut, Siret și Suceava, în Podișul Sacovățului, depresiunile Cracău - Bistrița, Huși și Rădăuți și Glacisul Orbeni. În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în cazul a 73% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 160 cm (Tupilați, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna iunie, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut față de luna mai, în 57% dintre forajele monitorizate aflate în Colinele Murighiol, Glacisul Măcinului, podișurile Gârliciu și Cobadin, iar 14% din foraje au crescut (Podișul Casimcei). În comparație cu *media lunară multianuală*, nivelurile s-au situat, în cazul a 71% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 480 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15

Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488

Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA IULIE IN RAPORT CU MEDIA Lunii Iunie SI CU MINIMELE ISTORICE

Legenda

Nivelul piezometric al lunii iunie
si tendinta de evolutie pentru luna iulie (cm)

265 (-20) ▲ Niveluri in crestere (<-5)

95 (4) ● Niveluri stationare (-5÷5)

108 (30) ▼ Niveluri in scadere (>5)

Corpuri de ape subterane freatice a caror
suprafata piezometrica se situeaza
fata de minima istorica astfel:

mai mult de 100 cm deasupra

intre 99 – 50 cm deasupra

intre 51 – 0 cm deasupra

sub minima istorica

