



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apeilor



PROGNOZA PENTRU LUNA AUGUST

BULETIN HIDROGEOLOGIC

- pentru apele subterane freatice -

Câmpia Română, Piemontul și Subcarpații Getici

În luna august, se estimează că nivelurile apelor subterane freatice în forajele de monitorizare vor avea un regim staționar în 43% dintre acestea și vor scădea în aproximativ 48% dintre forajele aflate în bălțile Brăilei și Borcei, câmpiile Băilești, Burdea, Caracal, Călnău, Călniștea, Gherghiței, Ilfov, Jiana, Movilița, Punghina, Râmnic, Siret și Titu, câmpurile Ianca, Leu - Rotunda, Otopeni, Roșiori, Urziceni și Viziru, culoarele râurilor Jiu și Olt, Dealurile Cernei, depresiunile Cislău și Târgu Jiu, luncile Argeș - Sabar, Bârlad, Bistreț, Buzău, Călmățui, Jiu - Jieț și Olt, Podișul Teslui, Glacisul Valea Călugărească.

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

Nivelurile apelor subterane freatice în luna august vor avea o tendință generală de scădere în 76% dintre forajele monitorizate și de staționaritate în 24% dintre acestea. Scăderi ale nivelului vor avea loc în foraje din câmpiile Arad, Banloc, Barcău, Bega, Ier, Moravița, Nădlac, Sinersig, Timișana, Timișoara, Tormac. Vinga și Valea lui Mihai, Câmpia Joasă a Crișurilor, Câmpia Joasă a Someșului, Dealurile Nerei, depresiunile Caraș, Caransebeș, Copalnic, Făget, Zalău, Vărădia și Vad - Oradea.

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

În 59% dintre foraje, în luna august, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendință generală de scădere, iar în 38% tendința va fi staționară. Sunt posibile scăderi de nivel în foraje amplasate în culoarele râurilor Mureș, Someșul Mic, Someșul Mare și Târnava Mică și depresiunile Câmpia Turzii, Făgăraș, Gheroghieni, Prejmer și Sibiu.

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna august, nivelurile apelor subterane freatice vor avea o tendință generală de scădere în aproximativ 58% dintre foraje, iar în restul forajelor tendința este de staționaritate. Sunt posibile scăderi de nivel în foraje amplasate în podișurile Sacovăț și Vulturești, depresiunile Dorohoi, Hârlău, Huși și Rădăuți, în dealurile Chicerii și Pleșu, colinele Gloduri- Coada Stâncii, Ibăneșei și Miletinului și în culoarele râurilor Moldova, Prut, Siret și Suceava.

Podișul Dobrogei

Apele freatice din Podișul Dobrogei vor avea în luna august un regim staționar în 71% din forajele de monitorizare. În restul de 29% dintre foraje regimul va fi unul în scădere (foraje din Colinele Murighiol și Podișul Casimcea).

DIRECTOR,

Ing. Cristian Constantin STOIAN

ȘEF SERVICIU CERCETĂRI APE SUBTERANE,
Dr. ing. Teodora VASILE



DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Dr. Viorel CHENDEȘ

ELABORAT,


Dr. ing. Gabriela STĂNESCU
(gabriela.stanescu@hidro.ro)

Dr. ing. Doina DRĂGUȘIN
(dragusin@hidro.ro)

AUGUST 2026

Nr. 651

CARACTERIZAREA LUNII IULIE



Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici

În comparație cu luna anterioară, în luna iulie, nivelurile apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 62% din numărul forajelor aflate în observație, au avut un regim staționar în 21% și au crescut în 17% dintre acestea. Scăderi de nivel situate în intervalul 50 - 100 cm s-au înregistrat în câmpiile Caracal și Gherghiței, Dealurile Cernei și Depresiunea Cislău, iar în Balta Borcei și Câmpia Titu scăderile au fost de până la 150 cm. Creșteri de până la 30 cm au fost înregistrate în unele foraje din câmpiile Băilești și Călniștea și luncile Bistreț și Buzău. Comparativ cu media lunară multianuală, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 72% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 360 cm (Brastavățu, Câmpia Caracalului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crișanei și Banatului

În luna iulie, nivelurile apelor subterane freatice au înregistrat scăderi față de luna anterioară în 86% din numărul punctelor de observație, nu au avut variații în 11% și au crescut în 3% dintre acestea. Scăderi de până la 60 cm s-au înregistrat în câmpiile Banloc, Bega, Ier, Miersig, Moravița, Nădlac, Sinersig, Tormac, Timișoara, Valea lui Mihai și Vinga, Câmpia Joasă a Crișurilor, Câmpia Joasă a Someșului, Dealurile Nerei și depresiunile Caransebeș, Caraș, Copalnic, Făget, Vărădia și Zalău. În comparație cu media lunară multianuală, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în 98% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 400 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersig).

Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali

Nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în luna iulie comparativ cu luna iunie în 67% din totalul forajelor de monitorizare, în 18% dintre acestea regimul a fost staționar, iar în 15% au fost înregistrate creșteri. Scăderi de nivel până la 50 cm au fost înregistrate în culoarele râurilor Aiud, Deva, Mureș, Târnava Mică, Someșul Mic și Mare, Dealurile Nirajului și depresiunile Bârsei, Făgăraș, Prejmer, Săliște și Sibiu. În comparație cu media lunară multianuală, nivelurile s-au situat, în 79% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 170 cm (Sânsimion, Depresiunea Ciuc).

Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură

În luna iulie, în comparație cu luna anterioară, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut în 70% din forajele de monitorizare și au crescut în 15% dintre acestea. Scăderi de până la 50 cm s-au produs în zona colinelor Chinejei, Ibăneșei și Gloduri- Coada Stâncii, în culoarele râurilor Moldova, Siret și Prut, depresiunile Cracău - Bistrița, Dorohoi, Hârlău, Huși și Rădăuți, podișurile Sacovăț și Vulturești. În comparație cu media lunară multianuală, nivelurile apelor subterane freatice s-au situat, în cazul a 72% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 150 cm (Tupilați, Culoarul Moldovei).

Podișul Dobrogei

În luna iulie, nivelurile apelor subterane freatice au scăzut față de luna iunie, în 72% dintre forajele monitorizate aflate în Colinele Murighiol și podișurile Casimcea și Cobadin, iar în 14% din foraje acestea au crescut (Glacisul Măcinului). În comparație cu media lunară multianuală, nivelurile s-au situat, în cazul a 71% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 480 cm (Cuza Vodă, Podișul Cernavodă).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686

Tel: +4 021 318 11 15

Fax: +4 021 318 11 16

Email: relatii@hidro.ro

Cod Fiscal: RO 24582488

Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127

PROGNOZA NIVELURILOR PIEZOMETRICE PENTRU LUNA AUGUST IN RAPORT CU MEDIA LUNII IULIE SI CU MINIMELE ISTORICE



Legenda

Nivelul piezometric al lunii iulie
si tendinta de evolutie pentru luna august (cm)

265 (-20) ▲ Niveluri in crestere (<-5)

95 (4) ● Niveluri stationare (-5÷5)

108 (30) ▼ Niveluri in scadere (>5)


Corpuri de ape subterane freatice a caror
suprafata piezometrica se situeaza
fata de minima istorica astfel:

mai mult de 100 cm deasupra

intre 99 – 50 cm deasupra

intre 51 – 0 cm deasupra

sub minima istorica



0 50 100 150 200 km